

IMAGEN INTERESANTE



Paciente masculino, 25 años, casado, agricultor, 2do primaria, O/R Salamá, Baja Verapaz

Motivo de Consulta: Tos de 8 días de evolución

Historia de la enfermedad: Tos no productiva de 8 días de evolución asociado a fiebre no cuantificada por termómetro, disnea de medianos esfuerzos. 4 días previos a consultar paciente nota la presencia de lesiones vesiculares y costrosas que inicia en cuero cabelludo y posteriormente se disemina a tórax y miembros. Disnea se exagera por lo cual consulta.

Antecedentes: LLA hace 3 años. Tratada con prednisona 50 mg/día. No llevaba seguimiento en hematooncología.

Rx tórax: Patrón intersticial difuso.

Impresión Clínica:

1. Neumonía por Varicela.
2. LLA en recaída.
3. SDRA

El 90 % de neumonías primarias por varicela afectan a personas en edad adulta, si la varicela se complica con neumonía la mortalidad pasa del 1% al 10–30%. En adultos sanos la evolución puede ser favorable en 5 días, si evoluciona a SDRA puede llegar a tener una mortalidad de 50 % sobre todo en mujeres embarazadas e inmunodeprimidos, como es el caso de este paciente.

Dra. Verónica Patzán

